ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016	Collège ST
	Parcours : Licence de Mathématiques	
	UE : Géométrie Différentielle (N1MA6011)	
	Date : 18/03/2016 Heure : 8h30 Durée : 1h30	
	Documents : Non autorisés. Calculatrice : autorisée	
Epreuve de Mr : Bessières. Sujet : 1 page		

Exercice 1 (Cours). (1) Soit A un arc géométrique et $p \in A$. Donner la définition de la bi-régularité de A , en fonction d'un paramétrage de A , et montrer qu'elle ne dépend pas du paramétrage.

- (2) Montrer qu'une courbe régulière $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ admet une paramétrisation par longueur d'arc.
OU
- (3) Soit $p, q \in \mathbb{R}^n$, on note $[p, q]$ le segment $[0, 1] \ni t \mapsto p + t(q - p)$. Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ une courbe régulière lisse joignant p à q . Montrer que $\|q - p\| \leq L(\gamma)$ avec égalité si et seulement si γ et $[p, q]$ sont équivalents.
- (4) Donner l'énoncé du théorème de redressement des immersions.
- (5) Donner un contre-exemple à ce que l'image d'une immersion soit une sous-variété (justifier).
- (6) Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension d et $p \in M$. Soit $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$ une submersion telle que $M = g^{-1}(\{0\})$. Montrer que l'espace tangent $T_p M$ est égal à $\ker d_p g$.

Exercice 2. Soit $c : s \in \mathbb{R} \mapsto (x(s), y(s), z(s)) \in \mathbb{R}^3$ la courbe paramétrée donnée par :

$$\begin{cases} x(s) = \frac{1}{2} \sin(s) \\ y(s) = (\sin(s/2))^2 \\ z(s) = \frac{\sqrt{3}}{2} s. \end{cases}$$

- (1) Montrer que c est une courbe régulière paramétrée par longueur d'arc.
- (2) Pour chaque $s \in \mathbb{R}$, calculer la courbure $K(s)$ et la torsion $T(s)$ de la courbe.
- (3) Pour chaque $s \in \mathbb{R}$, donner explicitement le repère de Frenet $(t(s), n(s), b(s))$.

Exercice 3. Soit a, b, c trois nombres réels strictement positifs. On considère l'ellipsoïde Σ d'équation

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} = 1$$

- (1) Justifier que Σ est sous-variété de $\mathbb{R}^3$.
- (2) Soit L le demi-plan fermé de $\mathbb{R}^3$ défini par $y = 0$ et $x \geq 0$, V l'ouvert $\mathbb{R}^3 \setminus L$ (c'est-à-dire $\mathbb{R}^3$ privé de L), et $S = \Sigma \cap V$. Donner une paramétrisation $f : U \rightarrow S$, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4. Soit $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ définie par $f(A) = \det(A)$.

- (1) Montrer que $f(I_n + hA) = 1 + \text{htr}(A) + o(h)$. En déduire la différentielle de f en l'identité, $d_{I_n} f(A)$.

- (2) Soit M une matrice inversible. Dédurre de la question précédente la différentielle de f en M , $d_M f(A)$.
- (3) Montrer que $SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}), \det M = 1\}$ est une sous-variété de $M_n(\mathbb{R})$. Quelle est sa dimension ? Montrer que son espace tangent en I_n est l'ensemble $\{A \in M_n(\mathbb{R}), \text{tr}(A) = 0\}$.