

FEUILLE D'EXERCICES n° 4

Anneaux factoriels (2), irréductibilité

Exercice 1 –

- 1) Soient $P(X), Q(X) \in \mathbb{Q}[X]$. Montrer que $P(X)$ et $Q(X)$ ont le même pgcd dans $\mathbb{Q}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.
- 2) Soit $P(X) \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Montrer que $P(X)$ n'a que des racines simples dans \mathbb{C} .
- 3) Soient x_1, x_2, \dots, x_n des complexes deux à deux distincts ($n \geq 1$). Soient m_1, m_2, \dots, m_n des entiers ≥ 1 . Montrer que si $P(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i)^{m_i} \in \mathbb{Q}[X]$ alors $Q(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \in \mathbb{Q}[X]$.

Exercice 2 –

- 1) Dresser la liste des polynômes irréductibles de degré ≤ 3 de $\mathbb{F}_2[X]$.
- 2) Le polynôme $X^6 + X + 1$ est-il irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$?
- 3) Que dire du polynôme $X^6 - 2019X + 2001$ dans $\mathbb{Z}[X]$? Dans $\mathbb{Q}[X]$?

Exercice 3 – Soit p un nombre premier impair.

- 1) On note G l'ensemble des carrés non nuls de \mathbb{F}_p . Quel est le cardinal de G ?
- 2) On note H l'ensemble des éléments non nuls de \mathbb{F}_p qui ne sont pas des carrés. Quel est le cardinal de H ?
- 3) Soit α un élément de H . Montrer que $\alpha G = H$.
- 4) En déduire que si $(\alpha, \beta) \in H \times H$, alors $\alpha\beta \in G$.
- 5) Soit $P(X) = X^4 - 10X^2 + 1$. Montrer que $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ et dans $\mathbb{Q}[X]$.
- 6) Montrer que pour tout premier q , $P(X)$ est réductible dans $\mathbb{F}_q[X]$. Lorsque $q > 2$, on pourra commencer par supposer que 2 est un carré modulo q , puis que 3 est un carré modulo q . Enfin on traitera le cas où ni 2 ni 3 ne sont des carrés dans \mathbb{F}_q à l'aide de la question 4.
- 7) De même, montrer que $X^4 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ mais réductible dans $\mathbb{F}_q[X]$ quel que soit q premier.

Exercice 4 – Soit $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{3}] = \{a + bi\sqrt{3}; a, b \in \mathbb{Z}\}$, qui muni des lois usuelles est un anneau commutatif unitaire intègre. Soit $P(X) = X^2 - X + 1 \in A[X]$.

- 1) Montrer que $P(X)$ est irréductible dans $A[X]$.
- 2) Soit K le corps des fractions de A . Montrer que dans $K[X]$, $P(X)$ n'est pas irréductible.
- 3) Comment expliquer ce phénomène ?

Exercice 5 –

- 1) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ il existe dans $\mathbb{Z}[X]$ des polynômes irréductibles dans $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$ de degré n .
- 2) Soit p un nombre premier. Montrer que $R(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$.
- 3) Supposons $p \geq 4$ non premier. Montrer que $R(X)$ n'est irréductible ni dans $\mathbb{Z}[X]$ ni dans $\mathbb{Q}[X]$.
- 4) Soit p un nombre premier. Pour quelles valeurs de p le polynôme $X^p + pX + p - 1$ est-il irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$? Dans $\mathbb{Q}[X]$?
- 5) Soit $P(X, Y) = X^2Y^3 + X^2Y^2 - 2XY^2 + X + Y^3 + Y^2 - 1$. Montrer que $P(X, Y)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X, Y]$.