

Tableaux des dérivées

On rappelle les dérivées des fonctions usuelles ainsi que les formules générales de dérivation.

Fonction	Domaine de dérivabilité	Dérivée
$\ln(x)$	$\mathbb{R}^{+,*}$	$\frac{1}{x}$
e^x	\mathbb{R}	e^x
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^{+,*}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
\sqrt{x}	$\mathbb{R}^{+,*}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\cos(x)$	\mathbb{R}	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	\mathbb{R}	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[, k \in \mathbb{Z}$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arccos(x)$	$] -1; 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arcsin(x)$	$] -1; 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	\mathbb{R}	$\frac{1}{1+x^2}$
$\cosh(x)$	\mathbb{R}	$\sinh(x)$
$\sinh(x)$	\mathbb{R}	$\cosh(x)$
$\tanh(x)$	\mathbb{R}	$1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$
$\text{arcosh}(x)$	$]1; +\infty[$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\text{arsinh}(x)$	\mathbb{R}	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\text{artanh}(x)$	$] -1; 1[$	$\frac{1}{1-x^2}$

Opération	Dérivée
$f + g$	$f' + g'$
$f \cdot g$	$f' \cdot g + f \cdot g'$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
$g \circ f$	$f' \times g' \circ f$
$(f \cdot g)^{(n)}$	$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$
$(f^{-1})'$	$\frac{1}{f' \circ f^{-1}}$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$u^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^*$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
\sqrt{u}	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
$\exp(u)$	$u' \exp(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$

Tableau des primitives

Fonction	Intervalle d'intégration	Primitive
$(x - a)^n, n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}$	\mathbb{R}	$\frac{1}{n+1}(x - a)^{n+1}$
$\frac{1}{x - a}, a \in \mathbb{R}$	$] -\infty; a[\cup]a; +\infty[$	$\ln(x - a)$
$\frac{1}{(x - a)^n}, a \in \mathbb{R}, n \geq 2$	$] -\infty; a[\cup]a; +\infty[$	$-\frac{1}{(n-1)(x - a)^{n-1}}$
$\cos(ax), a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	\mathbb{R}	$\frac{1}{a} \sin(ax)$
$\sin(ax), a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	\mathbb{R}	$-\frac{1}{a} \cos(ax)$
$\tan(x)$	$]k\pi - \frac{\pi}{2}; k\pi + \frac{\pi}{2}[, k \in \mathbb{Z}$	$-\ln(\cos(x))$
$\ln(x)$	$\mathbb{R}^{+,*}$	$x \ln(x) - x$
$e^{ax}, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	\mathbb{R}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$(x - a)^\alpha, a \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$]a; +\infty[$	$\frac{1}{\alpha+1}(x - a)^{\alpha+1}$
$a^x, a > 0$	\mathbb{R}	$\frac{1}{\ln(a)} a^x$
$\frac{1}{x^2 + 1}$	\mathbb{R}	$\arctan(x)$
$\sqrt{x - a}, a \in \mathbb{R}$	$]a; +\infty[$	$\frac{2}{3}(x - a)^{3/2}$
$\frac{1}{\sqrt{x - a}}, a \in \mathbb{R}$	$]a; +\infty[$	$2\sqrt{x - a}$
$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$	$] -1; 1[$	$\arcsin(x)$

Quelques formules de trigonométrie vraiment utiles. a, b et x sont des réels (quelconques) :

$$\begin{aligned} \cos^2(x) + \sin^2(x) &= 1, & \cos(a + b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b), & \sin(a + b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b), \\ \cos(2x) &= 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x), & \cos^2(x) &= \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \\ \sin(2x) &= 2\sin(x)\cos(x), & \sin^2(x) &= \frac{1 - \cos(2x)}{2}. \end{aligned}$$

Pour étudier certaines courbes paramétrées faisant intervenir sin et cos, il est parfois utile d'effectuer le changement de variable $t = \tan(\frac{x}{2})$, d'où les formules suivantes :

$$\cos(x) = \frac{1 - \tan^2(\frac{x}{2})}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})}, \quad \sin(x) = \frac{2 \tan(\frac{x}{2})}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})}.$$

Et tant qu'on y est, une factorisation utile (formules de l'arc-moitié) :

$$e^{i\alpha} + e^{i\beta} = 2 \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \exp\left(i\frac{\alpha + \beta}{2}\right), \quad e^{i\alpha} - e^{i\beta} = 2i \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \exp\left(i\frac{\alpha + \beta}{2}\right).$$

Développements limités usuels en 0

Les développements limités usuels suivants sont à connaître par cœur !

$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	Taylor-Young
$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$	Taylor-Young
$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	par dérivation de \sin
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$	Taylor-Young
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$	composition par $-x$
$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$	intégration de $\frac{1}{1-x}$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$	composition par $-x$
$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	intégration de $\frac{1}{1+x^2}$
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$	Taylor-Young
$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} x^n + o(x^n)$	Taylor-Young ou $\alpha = \frac{1}{2}$
$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8} x^2 + \cdots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} x^n + o(x^n)$	Taylor-Young ou $\alpha = -\frac{1}{2}$
$\arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	intégration de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 - \frac{17}{315} x^7 + o(x^8)$	par division
$\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+3})$	somme de e^x et e^{-x}
$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	somme de e^x et e^{-x}